

Den helt enkle plan forår 2017

Vårbyg og havre med - og uden græsudlæg

Problem	Middel	Dosering	Kommentar
Afgrødens st. 20-29: Alm. tokimbladet ukrudt inkl. burresnerre, hanekro og valmuer, men uden resistente arter.	Trimmer/Express SX + Primus XL + Fieldor Max	5 g + 0,2-0,25 ltr. + 0,1 ltr.	I vårbyg med - og uden græsudlæg, kan desuden anbefales en god anti-resistensstrategi bestående af 5 g/ha Express + 50 ml/ha Legacy 500 SC + 125 ml/ha Pixxaro .
Meldug, bygrust, skoldplet, bladplet, Ramularia i byg og meldug samt havrebladplet i havre.	Prosaro + Comet Pro	0,35-0,5 ltr. + 0,15-0,2 ltr.	Bortset fra i Evergreen og sortsblending anbefales I vårbyg delt behandling: St. 31-35: 0,25 ltr. Prosaro; St. 49-53: 0,2 ltr. Comet Pro + 0,25 ltr. Prosaro
Manganmangel	Mangannitrat	1-2,0 ltr.	
Mn, Cu, Zn,B; Vedligeholdelsesgødskning	Phytavis Korn	0,75 ltr.	Primært på planteavlsbrug uden husdyrgødning.

Vårbyg med kløvergræsudlæg

St. 26-30. Alm. ukrudt	Stomp CS + Fighter 480	0,5-1,0 ltr. + 1,0-1,5 ltr.	Min. temp. 12 grader C. Kløveren skal have et trekoblet blad ved behandling.
Mht. sygdomme og Mn-mangel: Se ovenstående.			

Hvede og tritcale

<u>Behandlet efterår:</u> Forår st. 30-32 Opfølgning mod enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt.	Cossack OD + Renol/Fieldor Max	0,5 - 0,6 ltr. + 0,5 / 0,2 ltr.	Højeste dosering ved store planter af enårig enårig rapgræs. Maks. 0,6 ltr. Cossack i rug. Ukrudt skal være i aktiv vækst. Er der intet græsukrudt kan anvendes 0,5 ltr. Primus XL eller 0,5-0,75 ltr. Zypar. Zypar bekæmper ved højeste dosering resistent tokimbladet ukrudt.
Vækstregulering St. 30	Cycocel 750 + Moddus Start	0,5 ltr. + 0,1-0,2 ltr.	God vækst og temp. over 12 grader.
Meldug. St. 30-37.	Prosaro	0,30 ltr.	Anbefales ved angreb af meldug i maj.
Septoria, gulrust, meldug. Stadie 39-45.	Viverda + Ultimate + Prosaro	0,35 ltr. + 0,35 ltr. + 0,25 ltr.	Første aksbeskyttelse. I Triticale anbefales 0,3 ltr. Folicur Xpert. Min. 200 ltr. vand/ha.
Septoria, gulrust, meldug. Stadie 53-65.	Viverda + Ultimate	0,6 ltr. + 0,6 ltr.	Anden aksbeskyttelse. Min. 200 ltr. vand/ha.
Manganmangel	Mangannitrat	1-2,0 ltr.	
Mn, Cu, Zn,B; Vedligeholdelsesgødskning	Phytavis Korn	0,75 ltr.	Primært på planteavlsbrug uden husdyrgødning.

Vinterbyg


<u>Ubehandlet efterår:</u> Enårig rapgræs samt alm. tokimbladet ukrudt	Hussar Plus OD + Renol/Fieldor Max	50 ml + 0,5 / 0,2 ltr.	Max dosis i vinterbyg er 50 ml Hussar Plus OD.
<u>Behandlet efterår:</u> St. 20-29 Tokimbladet ukrudt inkl. kamille, valmue, burresnerre	Primus XL	0,5 ltr.	Primus XL kan anvendes tidligt ved temperaturer over 5 grader. Er der anvendt Hussar følges ved behov op med Primus XL. Alternativt kan anvendes 8 g Trimmer/Express SX, når der IKKE er sprøjtet med Hussar.
Meldug, bygrust, skoldplet, bladplet	Prosaro + Comet Pro	0,35-0,5 ltr. + 0,15	Alternativt St. 31-35: 0,2 - 0,25 Prosaro; St. 49-53: 0,15 Comet Pro + 0,15 - 0,25 Prosaro
Manganmangel	Mangannitrat	1-2,0 ltr.	
Mn, Cu, Zn,B; Vedligeholdelsesgødskning	Phytavis Korn	0,75 ltr.	Primært på planteavlsbrug uden husdyrgødning.

Basisbehandlinger i raps og majs forår 2017

Vinterraps

Problem	Middel	Dosering	Kommentar
Kamille, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk	Matrigon 72 SG + Fieldor Max	0,11 kg + 0,2 ltr.	Fra stadie 31-50. Optimal effekt ved morgensprøjtning. Temp. min. 15 grader C
Knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp.	Amistar + Orius 200 EW	0,35 ltr. + 0,5 ltr.	Amistar + Orius udbringes st. 65, når de første kronblade falder af.
Vækstregulering forår st. 30-32 (Fra begyndende strækning til 2. internodie er synlig).	Caryx	0,7 ltr.	Behandling forår såfremt der ikke er behandlet i efteråret. Caryx virker bedst tidligt (ved begyndende strækningsvækst).
Glimmerbøsser	Mavrik 2 F / Mavrik Vita	0,2 ltr.	Skadetærskel: 3 glimmerbøsser pr. plante i tidlig knopstadium. Over 6 i det sene knopstadium. Min. 200 ltr. vand pr. ha.
Skulpesnudebiller og skulpegalmug	Karate	0,3 kg	Efter varsling eller når skadetærskel er nået. KUN udenfor biernes flyvetid fra kl. 21-03.
Bormangel m.m.	MicroCare Bor 150 MEA eller EPSO Microtop (Mg, S, B, Mn)	2-3,0 ltr. eller 10 kg	Vinterraps bør tilføres bor, da afgrøden ofte er i underskud. Op til maks. 3 ltr. Bor 150 MEA kan tankblandes med Biscaya.

Fodermajs



Tokimbladet ukrudt inkl. storkenæb, stedmoder, pileurter	Callisto / Meristo + MaisTer + MaisOil	0,5 ltr. + 40-50 g + 0,5-0,67 ltr.	1. behandling på ukrudtets kimbladstadie. Ved mange ærenpris øges doseringen af Callisto til 0,75 ltr/ha. Mod pileurter og raps kan tilsættes 5,6 gram Harmony SX pr. ha fra majsens 2- bladstadie.
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs	MaisTer + MaisOil + Starane 333 HL	50 - 75 g + 0,67 - 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	2. behandling 10-12 dage senere. Ved mange storkenæb tilsættes 0,3-0,5 ltr. Fighter 480. Bemærk temp. skal være over 12 grader C. Starane 333 HL samt Tomahawk ikke efter majsens 5- bladstadie.
Bormangel	MicroCare Bor 150 MEA	2-3,0 ltr.	Majs bør som hovedregel tilføres bor, da afgrøden ofte er i underskud. Bor 150 MEA kan blandes med ukrudtsmidler.
Mikronæringsstoffer inkl. S, Mg, Mn, Zn	EPSO Combitop	15 kg	Fra majsens 3-4 bladstadie.